囊裸藻属一新种

王全喜

(上海师范大学生物系 上海 200234)

A new species of Trachelomonas (Euglenophyta) from China

WANG Quan-Xi

(Department of Biology, Shanghai Normal University, Shanghai 200234)

Key words Trachelomonas; T. heteromorpha Q. X. Wang; New species; China 关键词 囊裸藻属; 异形囊裸藻; 新种; 中国

异形囊裸藻 新种 图 1,图 2

Trachelomonas heteromorpha Q. X. Wang, sp. nov. Fig. 1, Fig. 2




图 1 异形囊裸藻 1. 正面观; 2. 顶面观; 3. 侧面观。

Fig. 1 Trachelomonas heteromorpha Q. X. Wang 1. Front view; 2. Top view; 3. Side view.

Species nova cum T. granulatopsi Shi congruens, sed a qua lorica ovata e fronte visa, obovata e latere visa, poro flagelli collo instructo distincta.

Lorica ovata a fronte visa, antice angusta, postice late rotundata et plerumque inspissta, interdum caudato-papillata, obovata a latere visa, antice lata, postice angusta, brunnea vel fulva. Superficies loricae scabrosa, tuberculis irregularibus et punctis sparsis instructa (lorica per microscopum electronicum visa e granis composita). Porus flagelli collo recto vel paulo obliquo antice paulo angusto margine planiusculo instructus. Flagellum longitudine loricam aequans vel ea paulo

²⁰⁰⁰⁻¹²⁻²⁵ 收稿,2001-03-15 收修改稿。

longius. Lorica $23.5 \sim 24~\mu m$ longa, $16 \sim 18~\mu m$ lata, $12 \sim 14~\mu m$ crassa; collum $3 \sim 4~\mu m$ altum, parte angusta circa $3~\mu m$ latum, parte basilari $4 \sim 4.5~\mu m$ latum, poro colli circa $3~\mu m$ diam.




图 2 异形囊裸藻 1~4. 囊壳扫描电镜照片 1. 正面观; 2. 侧面观; 3. 前部放大; 4. 中部放大。 5~6. 光镜照片 5. 正面观; 6. 侧面观。

Fig. 2 Trachelomonas heteromorpha Q. X. Wang 1~4. SEM micrographs of lorica 1. Front view; 2. Side view;
3. Magnification of anterior; 4. Magnification of middle part of lorica. 5~6. LM micrographs of lorica
5. Front view; 6. Side view.

China. Heilongjiang (黑龙江): Mudanjiang (牡丹江), Ningan (宁安), in rice field, water temp. 27℃, pH7.5, 1995-07-05, Q. X. Wang (王全喜) HLJ95118 (holotype, here designated, HANU).

囊壳正面观卵形,前端窄,后端宽圆且常加厚,有时具小的乳头状尾突;侧面观倒卵形,前端宽,后端狭窄。褐色或黄褐色。表面粗糙,具不规则的瘤状突起和稀疏的细点纹;电镜下观察囊壳由块状颗粒组成,具稀疏孔纹;鞭毛孔具一直或稍斜的领,领口平截;领的前端较基部窄,内径上下一致。鞭毛比囊壳稍长或等长。囊壳长 23.5~24 μm,宽 16~18 μm,厚 12~14 μm;领高 3~4 μm,前端宽约 3 μm,基部宽 4~4.5 μm,内径约 3 μm。

新种与拟颗粒囊裸藻 T. granulatopsis Shi 相近,但鞭毛孔具领,囊壳正面观卵形,侧面观倒卵形,易与后者区别。

致谢 本文承蒙施之新先生审阅并做拉丁文修改,谨此致谢。

(责任编辑 徐 黎)